



Türkische Tanne

(*Abies bornmülleriana*)

Natürliches Verbreitungsgebiet:

Kleinasien

Standortsansprüche:

Bevorzugt nährstoffreichere Böden, erträgt aber auch trockenere Standorte.

Wasserbedarf



hoch

Nährstoffbedarf



mittel

Lichtbedarf



gering
Schattbaumart

Wurzelsystem

Herz- bis Pfahlwurzel



Gefährdungen

- Spezifische Bast- und Borken- sowie Bockkäfer
- Tannentrieblaus

Waldbauliche Behandlung

Die Türkische Tanne hat das typische langsame Jugendwachstum einer Schattbaumart. Von der waldbaulichen Behandlung ist sie ähnlich der heimischen Weißtanne. Wie auch diese meidet sie die Freifläche und verjüngt sich am besten unter Schirm. Die Wuchsleistung soll laut Literatur sogar etwas über der heimischen Tanne liegen.

Verwendung:

Das Holz ist sehr ähnlich der Weißtanne und kann ebenfalls als Bau- und Möbelholz verwendet werden.


Weitere Informationen:

[Abies bornmülleriana](#)

[Artensteckbrief LWF](#)

Literatur:

www.waldwissen.net
www.lwf.bayern.de



[Hölzel Verlag](#)



[Foto: DI Michael Reh](#)



[Foto: DI Michael Reh](#)